

# Задача о размещении филиалов банка

**Дано:**  $I = \{1, \dots, m\}$  — множество мест (районов, городов, округов), где можно открывать филиалы;

$J = \{1, \dots, n\}$  — множество потенциальных клиентов;

$f_i \geq 0$  — расходы на открытие филиала  $i$ .

$c_{ij} \geq 0$  — доход от обслуживания клиента  $j$  филиалом  $i$ .

$p > 0$  — максимальное число открываемых филиалов.

**Найти:** подмножество  $S \subset I$ ,  $|S| \leq p$ , открываемых филиалов, которое дает максимум суммарной прибыли.

**Переменные задачи:**

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{если открываем филиал } i, \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

$$z_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если клиент } j \text{ обслуживается филиалом } i, \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$



## Математическая модель

$$\max \left\{ \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} z_{ij} - \sum_{i \in I} f_i x_i \right\}$$

при ограничениях:

$$\sum_{i \in I} z_{ij} \leq 1, \quad j \in J;$$

$$x_i \geq z_{ij}, \quad i \in I, \quad j \in J;$$

$$\sum_{i \in I} x_i \leq p;$$

$$z_{ij}, x_i \in \{0, 1\}, \quad i \in I, j \in J$$

## Задача размещения производства

**Дано:**  $I = \{1, \dots, m\}$  — множество районов (городов, областей), где можно открыть производство некоторой продукции;

$J = \{1, \dots, n\}$  — множество потребителей этой продукции (клиентов);

$f_i \geq 0$  — затраты на организацию производства в пункте  $i$ .

$c_{ij} \geq 0$  — производственно–транспортные расходы на удовлетворение спроса  $j$ -го клиента  $i$ -м предприятием.

$p > 0$  — максимально возможное число предприятий.



**Найти:** подмножество предприятий  $S \subset I$ ,  $|S| \leq p$ , которое позволяет удовлетворить спрос всех клиентов с минимальными суммарными затратами.

## Переменные задачи:

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{если открываем предприятие } i, \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

$$z_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если предприятие } i \text{ обслуживает клиента } j, \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

## Математическая модель

$$\min \left\{ \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} z_{ij} + \sum_{i \in I} f_i x_i \right\}$$

при ограничениях:

$$\sum_{i \in I} z_{ij} = 1, \quad j \in J;$$

$$x_i \geq z_{ij}, \quad i \in I, \quad j \in J;$$

$$\sum_{i \in I} x_i \leq p;$$

$$z_{ij}, x_i \in \{0, 1\}, \quad i \in I, j \in J.$$

# Выбор состава системы технических средств

**Дано:**  $I = \{1, \dots, m\}$  — множество типов технических средств;

$J = \{1, \dots, n\}$  — множество видов работ, выполняемых этими техническими средствами;

$f_i \geq 0$  — затраты на разработку и организацию производства технического средства  $i$ -го типа;

$g_i \geq 0$  — затраты на производство одного средства  $i$ -го типа;

$c_{ij} \geq 0$  — затраты на выполнение одной работы  $j$ -го вида техническими средствами  $i$ -го типа;

$p_{ij} \geq 1$  — число технических средств  $i$ -го типа, необходимых для выполнения одной работы  $j$ -го вида;

$\varphi_j \geq 1$  — число работ  $j$ -го вида;

$p > 0$  — максимально возможное число типов технических средств в составе системы.



**Найти:** Состав системы, который позволил бы выполнить все работы с минимальными суммарными затратами.

**Переменные задачи:**

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{если включаем в состав системы технические средства } i\text{-го типа} \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

$v_i \geq 0$ , целые — число технических средств  $i$ -го типа в составе системы

$$z_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если работы } j\text{-го вида выполняются техническими средствами } i\text{-го типа} \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

## Математическая модель

$$\min \sum_{i \in I} \left( f_i x_i + g_i v_i + \sum_{j \in J} \varphi_j c_{ij} z_{ij} \right)$$

при ограничениях:

$$\sum_{i \in I} z_{ij} = 1, \quad j \in J;$$

$$v_i = \sum_{j \in J} \varphi_j p_{ij} z_{ij}, \quad i \in I;$$

$$x_i \geq z_{ij}, \quad i \in I, \quad j \in J;$$

$$\sum_{i \in I} x_i \leq p;$$

$$z_{ij}, x_i \in \{0, 1\}, \quad i \in I, j \in J.$$

## Двухуровневая задача размещения

**Дано:**  $I = \{1, \dots, m\}$  — множество мест, где можно открыть производство некоторой продукции;  
 $J = \{1, \dots, n\}$  — множество потребителей этой продукции (клиентов);  
 $f_i \geq 0$  — затраты на организацию производства в пункте  $i$ .

$c_{ij} \geq 0$  — производственно-транспортные расходы на удовлетворение спроса  $j$ -го клиента  $i$ -м предприятием.

$p > 0$  — максимально возможное число предприятий.



$d_{ij} \geq 0$  — предпочтения  $j$ -го клиента на множестве предприятий:

$\min_{i \in I} d_{ij}$  — наиболее желаемый поставщик;

$\max_{i \in I} d_{ij}$  — наименее желаемый поставщик.

**Найти:** Подмножество  $S \subset I$ ,  $|S| \leq p$ , открываемых предприятий, которые позволили бы удовлетворить спрос всех клиентов с минимальными суммарными затратами.

### Переменные задачи:

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{если открываем предприятие } i, \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

$$z_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если предприятие } i \text{ обслуживает клиента } j, \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

## Математическая модель

$$\min \left\{ \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} z_{ij}^* + \sum_{i \in I} f_i x_i \right\}$$

при ограничениях:

$$\sum_{i \in I} x_i \leq p;$$

$$x_i \in \{0,1\}, \quad i \in I,$$

где  $z_{ij}^*$  — оптимальное решение задачи потребителя:

$$\min \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} d_{ij} z_{ij}$$

при ограничениях:

$$\sum_{i \in I} z_{ij} = 1, \quad j \in J;$$

$$x_i \geq z_{ij}, \quad i \in I, \quad j \in J;$$

$$z_{ij} \in \{0,1\}, \quad i \in I, \quad j \in J.$$

# Квадратичная задача о назначениях

**Дано:**  $I = \{1, \dots, n\}$  — множество зданий, где могут размещаться цеха;

$J = \{1, \dots, n\}$  — множество производственных цехов;

$a_{kl}$  — расстояние между зданиями  $k, l \in I$ ;

$b_{ij}$  — объем продукции, транспортируемый из цеха  $i$  в цех  $j$ , где  $i, j \in J$ .



**Найти:** Размещение цехов по зданиям, при котором суммарный объем перевозок продукции был бы минимальным.

## Переменные задачи:

$$x_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{если цех } i \text{ размещается в здании } k, \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

## Математическая модель

$$\min \sum_{i \in J} \sum_{j \in J} \sum_{l \in I} \sum_{k \in I} a_{kl} b_{ij} x_{ik} x_{jl}$$

при ограничениях:

$$\sum_{i \in J} x_{ik} = 1, \text{ для всех } k \in I;$$


$$\sum_{k \in I} x_{ik} = 1, \text{ для всех } i \in J;$$

$$x_{ik} \in \{0,1\}, \text{ } i \in J, k \in I.$$

# Генетический алгоритм для задач размещения

Идея заимствована у живой природы и состоит в организации эволюции, целью которой является получение оптимального решения в сложной комбинаторной задаче:

$$\min \{ f(S), S \in Sol \}.$$



**Начальная популяция**  $P = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$  — набор допустимых решений исходной задачи.

**Шаг эволюции:** выбираем из популяции два решения, скрещиваем их, применяем мутацию, локальную перестройку и добавляем в популяцию, затем наихудшее решение удаляем из популяции.



## Общая схема алгоритма

1. Выбрать начальную популяцию  $P$  и запомнить рекорд  $F^* = \min_{i=1,\dots,k} f(S_i)$ .
2. Пока не выполнен критерий останова делать следующее:
  - 2.1. Выбрать “родителей”  $S_{i_1}, S_{i_2}$  из популяции.
  - 2.2. Применить к  $S_{i_1}, S_{i_2}$  оператор скрещивания и получить новое решение  $S'$ .
  - 2.3. Применить к  $S'$  оператор мутации и получить новое решение  $S''$ .
  - 2.4. Применить к  $S''$  оператор локального улучшения и получить новое решение  $S'''$ .
  - 2.5. Если  $f(S''') < F^*$ , то сменить рекорд  $F^* := f(S''')$ .
  - 2.6. Добавить  $S'''$  к популяции и удалить из нее наихудшее решение.

## Оператор скрещивания

Пусть  $S_1, S_2$  — два решения, задаваемые векторами  $X^1, X^2 \in \{0,1\}^n$ .

**Одноточечный оператор скрещивания:** выбираем случайным образом координату  $1 \leq l \leq n$  и новый вектор  $X'$  получает первые  $l$  координат от вектора  $X^1$ , а остальные от вектора  $X^2$ .

$$\begin{array}{l} X^1: (0 \ 1 \ 0 \ 0 \mid 1 \ . \ . \ . \ 0 \ 1 \ 1) \\ X^2: (1 \ 1 \ 0 \ 1 \mid 0 \ . \ . \ . \ 1 \ 1 \ 1) \\ X': (0 \ 1 \ 0 \ 0 \mid 0 \ . \ . \ . \ 1 \ 1 \ 1) \end{array}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_l$

Аналогично определяется двухточечный, трехточечный и т.д. операторы.

**Равномерный оператор скрещивания:** новое решение  $X'$  в каждой координате получает с вероятностью 0.5 значение одного из родителей.

## Выбор родителей

**Турнирная селекция:** из популяции  $P$  случайным образом выбирается некоторое подмножество  $P' \subseteq P$  и родителем назначается наилучшее решение в  $P'$ :

$$S_i = \min_{S \in P'} f(S).$$

**Пропорциональная селекция:** из популяции  $P$  случайным образом выбираются два родителя. Для решения  $S_i$  вероятность быть выбранным обратно пропорциональна значению целевой функции  $f(S_i)$ .

**Варианты:** Лучший в популяции + случайно выбранный.  
Случайно выбранный + наиболее удаленный от него и др.





## Локальное улучшение

Для решения  $S$  обозначим через  $N(S)$  его окрестность, например, множество всех решений  $S'$ , находящихся от  $S$  на расстоянии не более 2 (3, 4, 5...)

### Алгоритм локального спуска

1. Положить  $S := S''$ ;
2. Найти в окрестности решения  $S$  наилучшего соседа  $\bar{S}$

$$f(\bar{S}) = \min\{f(\hat{S}), \hat{S} \in N(S)\};$$

3. Если  $f(\bar{S}) < f(S)$ , то положить  $S := \bar{S}$  и вернуться на шаг 2, иначе STOP, получен локальный минимум.

## Задачи размещения в условиях конкуренции

$I = \{1, \dots, m\}$  — множество пунктов размещения;

$J = \{1, \dots, n\}$  — множество клиентов;


$c_{ij}$  — расстояние от пункта  $i$  до клиента  $j$ ;

$f_i$  — стоимость открытия предприятия в пункте  $i$  для первого ЛПР;

$g_i$  — стоимость открытия предприятия в пункте  $i$  для второго ЛПР;

$d_j$  — доход от обслуживания клиента  $j$ ;

Сначала ЛПР<sub>1</sub> принимает решение об открытии своих предприятий. Затем, зная это решение, ЛПР<sub>2</sub> открывает свои предприятия так, чтобы получить максимальный доход. Клиент знает оба решения и выбирает ближайшее к себе предприятие. Задача состоит в том, чтобы найти решение для ЛПР<sub>1</sub> с максимальных доходом.



## Переменные задачи

$$z_i = \begin{cases} 1, & \text{если ЛПР}_1 \text{ открыл предприятие в пункте } i \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

$$x_i = \begin{cases} 0, & \text{если ЛПР}_2 \text{ открыл предприятие в пункте } i \\ 1 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Для вектора  $z$  положим

$I_j(z) = \{i \in I \mid c_{ij} < \min(c_{kj} \mid z_k = 1)\}$  — множество пунктов размещения которые находятся ближе к клиенту  $j$ , чем ближайшее открытое предприятие, принадлежащие ЛПР<sub>1</sub>.

## Математическая модель

$$\max_z \left\{ \sum_{j \in J} d_j \prod_{i \in I_j(z)} x_i^* - \sum_{i \in I} f_i z_i \right\}$$

при ограничениях  $z_i \in \{0, 1\}$ ,  $i \in I$

и  $x^*$  — оптимальное решение задачи ЛПР<sub>2</sub>:

$$\max_x \left\{ \sum_{j \in J} d_j (1 - \prod_{i \in I_j(z)} x_i) - \sum_{i \in I} g_i (1 - x_i) \right\}$$

при ограничениях  $z_i + x_i \leq 1$ ,  $i \in I$ ,  $x_i \in \{0, 1\}$ ,  $i \in I$ .

Задача ЛПР<sub>2</sub> является экстремальным ограничением в задаче ЛПР<sub>1</sub>.

## Принятие решений путем голосования

Пусть в районе размещается  $p$  школ (больниц, Интернет-центров, ...).

$I = \{1, \dots, m\}$  — множество возможных пунктов размещения;

$J = \{1, \dots, n\}$  — множество клиентов (учащихся, ...);

$c_{ij}$  — матрица предпочтений (расстояний от  $i$  до  $j$ , чем меньше, тем лучше)

ЛПР<sub>1</sub> выдвигает проект  $z_i \in \{0, 1\}$ ,  $\sum_{i \in I} z_i = p$ , и хочет получить его одобрение.

ЛПР<sub>2</sub> — оппозиция, которая хочет “провалить” проект  $Z$  и выставляет свой проект  $X$ , зная проект  $Z$ .

Решение принимается голосованием.

Клиент отдает свой голос за тот проект, который ему “ближе”.



## Математическая модель

$$\max_z \sum_{j \in J} d_j \prod_{i \in I_j(z)} x_i^*$$

при ограничениях  $z_i \in \{0, 1\}$ ,  $i \in I$ ,  $\sum_{i \in I} z_i = p$ ,

и  $x^*$  — оптимальное решение задачи:

$$\max_x \sum_{j \in J} (1 - \prod_{i \in I_j(z)} x_i)$$


при ограничениях  $x_i \in \{0, 1\}$ ,  $i \in I$ ,  $\sum_{i \in I} x_i = p$ .

Если ЛПР<sub>1</sub> набрал больше половины голосов, то он “победил”.

## Пример

$I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\};$

$J = \{1, 2, 3\};$



При  $p = 1$  ЛПР<sub>1</sub> всегда проигрывает!

## Выбор состава системы при многоэтапном процессе выполнения работ

1. Работы из множества  $J = \{1, \dots, n\}$  выполняются не все сразу, а по частям: сначала  $J_1 \subset J$ , затем  $J_2 \subset J$  и т.д.

Множество работ  $J$  разбито на непересекающиеся подмножества  $J = \bigcup (J_l, l = 1, \dots, L)$ . Технические средства после выполнения работ первого этапа  $J_1$ , могут использоваться на втором этапе для работ из  $J_2$  и т.д.

2. Имеется начальный состав системы  $v_i^0 \geq 0, i \in I$ , то есть система уже существует и требуется ее пополнить, чтобы выполнить все работы на каждом этапе и суммарные затраты были бы минимальными.

## Математическая модель

$$\min \left\{ \sum_{i \in I} \left( f_i x_i + g_i v_i + \sum_{j \in J} \varphi_j c_{ij} z_{ij} \right) \right\}$$

при ограничениях

$$\sum_{i \in I} z_{ij} = 1, \quad j \in J;$$

$$\sum_{j \in J_l} \varphi_j p_{ij} z_{ij} \leq v_i^0 + v_i, \quad i \in I, \quad l = 1, \dots, L;$$

$$x_i \geq z_{ij}, \quad i \in I, \quad j \in J;$$

$$\sum_{i \in I} x_i \leq p;$$

$$x_i, z_{ij} \in \{0, 1\}, \quad v_i \geq 0, \quad \text{целые, } i \in I, j \in J.$$

# Задача долгосрочного планирования развития системы

Задан плановый период  $T = \{1, \dots, T\}$  и для каждого года  $t \in T$  известно множество работ  $J_t$ , подлежащих выполнению в этом году в объемах  $\varphi_{jt} > 0$ . Каждое техническое средство  $i \in I$  имеет срок службы  $\rho_i \geq 0$  и максимальный объем производства  $V_{it} \geq 0$  в году  $t \in T$ . Начальный состав системы содержит технические средства разного года выпуска, и величины  $v_{it}^0 \geq 0$  задают число технических средств  $i$ -го типа годных к эксплуатации в год  $t \in T$ .



Требуется найти вариант пополнения системы, при котором гарантируется выполнение всех работ в каждом году планового периода и суммарные затраты были бы минимальными.

## Математическая модель

$$\min \sum_{t \in T} \frac{1}{(1 + \chi)^{t-1}} \sum_{i \in I} \left\{ f_{it} x_{it} + g_{it} v_{it} + \sum_{j \in J_t} \varphi_j c_{ij} z_{ij} \right\}$$

при ограничениях 
$$\sum_{i \in I} z_{ij} = 1, \quad j \in J_t, \quad t \in T;$$

$$\sum_{j \in J_t} \varphi_j p_{ij} z_{ij} \leq v_{it}^0 + \sum_{\tau=t-\rho_i+1}^t v_{i\tau}, \quad i \in I, \quad t \in T;$$

$$0 \leq v_{it} \leq V_{it} \max_{\tau \leq t} x_{i\tau}, \quad i \in I, \quad t \in T;$$

$$z_{ij} \leq \max_{\tau \leq t(j)} x_{i\tau}, \quad i \in I, \quad t \in T;$$

$$x_{it}, z_{ij} \in \{0, 1\}, \quad v_{it} \geq 0, \quad \text{целые, } i \in I, j \in J_t, t \in T.$$