

УДК 512.66

О КОГОМОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
В ПОЛУАБЕЛЕВОЙ КАТЕГОРИИ  
Н. В. Глотко, В. И. Кузьминов

**Аннотация:** В полуабелевой категории строгой точной последовательности  $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$  коцепных комплексов соответствует когомологическая последовательность

$$\dots \rightarrow H^n(A) \rightarrow H^n(B) \rightarrow H^n(C) \rightarrow H^{n+1}(A) \rightarrow \dots$$

Исследуются условия точности гомологической последовательности в заданном ее члене. Библиогр. 6.

Будем рассматривать аддитивные категории, в которых выполнена

**Аксиома 1.** Каждый морфизм  $\alpha$  имеет ядро  $\ker \alpha$  и коядро  $\operatorname{coker} \alpha$ .

В аддитивной категории, удовлетворяющей аксиоме 1, каждый морфизм  $\alpha$  допускает каноническое разложение  $\alpha = (\operatorname{im} \alpha)\bar{\alpha}(\operatorname{coim} \alpha)$ , где  $\operatorname{im} \alpha = \ker \operatorname{coker} \alpha$ ,  $\operatorname{coim} \alpha = \operatorname{coker} \ker \alpha$ .

Морфизм  $\alpha$  называется *строгим*, если  $\bar{\alpha}$  — изоморфизм.

Будем использовать следующие обозначения:  $O_c, M, M_c, P, P_c$  — классы всех строгих морфизмов, мономорфизмов, строгих мономорфизмов, эпиморфизмов и строгих эпиморфизмов соответственно.

Аддитивная категория называется *полуабелевой*, если в ней кроме аксиомы 1 выполнены еще следующие две аксиомы.

**Аксиома 2.** В каждом универсальном квадрате

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\alpha} & B \\ f \downarrow & & g \downarrow \\ C & \xrightarrow{\beta} & D \end{array} \quad (1)$$

$$\alpha \in M_c \implies \beta \in M_c.$$

**Аксиома 2\*.** В каждом коуниверсальном квадрате

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{\beta} & C \\ g \downarrow & & f \downarrow \\ B & \xrightarrow{\alpha} & A \end{array} \quad (2)$$

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 01-01-00795).

$\alpha \in P_c \implies \beta \in P_c$ .

Последовательность  $A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$  называется *точной*, если  $\text{im } \varphi = \ker \psi$ . В полуабелевой категории последовательность  $A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$  точна тогда и только тогда, когда  $\text{coim } \psi = \text{coker } \varphi$ .

Последовательность  $0 \rightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \rightarrow 0$  называется *строго точной*, если  $\varphi = \ker \psi$  и  $\psi = \text{coker } \varphi$ .

Строго точной последовательности

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \rightarrow 0 \quad (3)$$

коцепных комплексов в полуабелевой категории соответствует *когомологическая последовательность*

$$\dots \rightarrow H^n(A) \xrightarrow{H^n(\varphi)} H^n(B) \xrightarrow{H^n(\psi)} H^n(C) \xrightarrow{\Delta^n} H^{n+1}(A) \rightarrow \dots \quad (4)$$

Д. А. Райков в [1] показал, что последовательность (4) точна и морфизмы, ее образующие, являются строгими, если все дифференциалы комплексов  $A$ ,  $B$  и  $C$  будут строгими морфизмами. В [2] дано следующее обобщение этого результата:

1) если дифференциал  $d_A^n$  комплекса  $A$  является строгим морфизмом, то последовательность (4) точна в членах  $H^n(B)$  и  $H^n(C)$ , а  $H^n(\psi)$  — строгий морфизм;

2) если дифференциал  $d_B^n$  комплекса  $B$  является строгим морфизмом, то последовательность (4) точна в членах  $H^n(C)$  и  $H^{n+1}(A)$ , а  $\Delta^n$  — строгий морфизм;

3) если дифференциал  $d_C^n$  комплекса  $C$  является строгим морфизмом, то последовательность (4) точна в членах  $H^{n+1}(A)$  и  $H^{n+1}(B)$ , а  $H^{n+1}(\varphi)$  — строгий морфизм.

Ясно, что условие строгости в указанном уточнении результата Д. А. Райкова в общем случае не может быть отброшено. Соответствующие примеры легко построить в категории  $\mathcal{Ban}$  банаховых пространств и непрерывных линейных операторов. Однако существуют полуабелевы категории, в которых каждой строго точной последовательности (3) соответствует точная последовательность (4). Так обстоит дело, например, в полуабелевых категориях, удовлетворяющих следующим условиям.

**Аксиома 3.** В каждом универсальном квадрате (1)  $\alpha \in M \implies \beta \in M$ .

**Аксиома 3\*.** В каждом коуниверсальном квадрате (2)  $\alpha \in P \implies \beta \in P$ .

Полуабелева категория называется *специальной*, если в ней выполнены аксиомы 3 и 3\*.

В настоящей работе мы заменяем условие строгости дифференциалов комплексов  $A$ ,  $B$  и  $C$  более слабым условием их универсальности и в результате получаем вариант теоремы о точности когомологической последовательности (4), охватывающий случай специальных полуабелевых категорий.

В следующей лемме перечислены используемые в дальнейшем известные свойства морфизмов в полуабелевой категории.

**Лемма 1** [1–3]. В полуабелевой категории справедливы следующие утверждения и им двойственные:

- 1)  $\ker \alpha \in M_c$  для каждого морфизма  $\alpha, \beta \in M_c \iff \beta = \text{im } \beta$ ;
- 2) если  $\alpha, \beta \in M_c$  и морфизм  $\alpha\beta$  определен, то  $\alpha\beta \in M_c$ ;
- 3)  $\alpha\beta \in M_c \implies \beta \in M_c$ ;
- 4) в коуниверсальном квадрате (2)  $\alpha \in M \implies \beta \in M, \alpha \in M_c \implies \beta \in M_c$ ;
- 5)  $\alpha\beta \in O_c$  и  $\beta \in P \implies \alpha \in O_c$ ;
- 6) морфизм  $\bar{\alpha}$  из канонического разложения произвольного морфизма  $\alpha$  является биморфизмом, т. е.  $\bar{\alpha} \in M \cap P$ .

Мономорфизм  $\alpha : A \rightarrow B$  называется *универсальным* [4], если для любого морфизма  $f : A \rightarrow C$  в универсальном квадрате (1)  $\beta \in M$ .

Эпиморфизм  $\alpha : B \rightarrow A$  называется *универсальным*, если для любого морфизма  $f : C \rightarrow A$  в коуниверсальном квадрате (2)  $\beta \in P$ .

Морфизм  $\alpha$  назовем *M-универсальным*, если  $\bar{\alpha}$  — универсальный мономорфизм, и *P-универсальным*, если  $\bar{\alpha}$  — универсальный эпиморфизм.

Будем использовать следующие обозначения:  $M_u, P_u, MO_u, PO_u$  — классы универсальных мономорфизмов, универсальных эпиморфизмов, *M-универсальных морфизмов* и *P-универсальных морфизмов* соответственно.

Очевидно, в полуабелевой категории  $M_c \subset M_u, P_c \subset P_u, O_c \subset MO_u \cap PO_u$ .

**Лемма 2.** В полуабелевой категории справедливы следующие утверждения и им двойственные:

- 1) если морфизм  $\alpha\beta$  определен и  $\alpha, \beta \in P_u$ , то  $\alpha\beta \in P_u$ ;
- 2) если  $\alpha\beta \in P_u$ , то  $\alpha \in P_u$ ;
- 3)  $P_u = P \cap PO_u$ ;
- 4) если морфизм  $\alpha\beta\gamma$  определен,  $\alpha \in M_c, \gamma \in P_c$ , то  $\alpha\beta\gamma \in PO_u \iff \beta \in PO_u$ ;
- 5) в коуниверсальном квадрате (2)  $\alpha \in PO_u \implies \beta \in PO_u$ ;
- 6)  $\beta\alpha \in PO_u, \beta \in M \implies \alpha \in PO_u$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Утверждения 1 и 2 доказаны в [4, предложения 2.8 и 2.9]. Пусть  $\alpha : B \rightarrow A$  — *P-универсальный морфизм*. Для произвольного морфизма  $f : C \rightarrow A$  рассмотрим коуниверсальные квадраты

$$\begin{array}{ccccc} E & \xrightarrow{\beta_1} & C & & F & \xrightarrow{\beta_2} & E & & D & \xrightarrow{\beta_3} & F \\ h \downarrow & & f \downarrow & & i \downarrow & & h \downarrow & & g \downarrow & & i \downarrow \\ \text{Im } \alpha & \xrightarrow{\text{im } \alpha} & A, & & \text{Coim } \alpha & \xrightarrow{\bar{\alpha}} & \text{Im } \alpha, & & B & \xrightarrow{\text{coim } \alpha} & \text{Coim } \alpha. \end{array}$$

Квадрат

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{\beta} & C \\ g \downarrow & & f \downarrow \\ B & \xrightarrow{\alpha} & A, \end{array}$$

где  $\beta = \beta_3\beta_2\beta_1$ , коуниверсален [4, с. 44]. По лемме 1  $\beta_1 \in M_c, \beta_2$  — биморфизм,  $\beta_3 \in P_c$ . Следовательно,  $\beta_2 = \bar{\beta}$ . Легко видеть, что  $\beta_2 \in P_u$ . Доказано утверждение 5 леммы.

Если морфизм  $\alpha\beta\gamma$  определен,  $\alpha \in M_c, \gamma \in P_c$ , то  $\bar{\beta} = \overline{\alpha\beta\gamma}$ . Поэтому  $\alpha\beta\gamma \in PO_u \iff \beta \in PO_u$ .

Если морфизм  $\beta\alpha$  определен и  $\beta \in M$ , то квадрат

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\alpha} & B \\ \text{id} \downarrow & & \downarrow \beta \\ A & \xrightarrow{\beta\alpha} & C \end{array}$$

коуниверсален. Согласно утверждению 5  $\beta\alpha \in PO_u \implies \alpha \in PO_u$ . Доказано утверждение 6.

Если  $\alpha \in P$ , то  $\alpha = \bar{\alpha} \text{coim } \alpha$ . Так как  $\text{coim } \alpha \in P_c$ , то по 1 и 2  $\alpha \in P_u \iff \bar{\alpha} \in P_u$ . Доказано утверждение 3.

Лемма доказана.

**Аксиома 4.** В универсальном квадрате (1)  $\alpha \in P_u \implies \beta \in P_u$ .

**Аксиома 4\*.** В коуниверсальном квадрате (2)  $\alpha \in M_u \implies \beta \in M_u$ .

Доказательство следующих двух лемм аналогично доказательству шп. 5 и 6 леммы 2.

**Лемма 3.** Если полуабелева категория удовлетворяет аксиоме 4, то в универсальном квадрате (1) в этой категории  $\alpha \in PO_u \implies \beta \in PO_u$ .

**Лемма 4.** Если полуабелева категория удовлетворяет аксиоме 4\*, то  $\beta\alpha \in MO_u, \beta \in M \implies \alpha \in MO_u$ .

**Лемма 5.** Пусть диаграмма

$$\begin{array}{ccccc} & & D & \xrightarrow{\gamma} & E \\ & \nearrow \alpha & \beta \downarrow & & \delta \downarrow \\ A & \xrightarrow{\varphi} & B & \xrightarrow{\psi} & C \end{array} \quad (5)$$

в полуабелевой категории коммутативна,  $\psi = \text{coker } \varphi$ ,  $\gamma = \text{coker } \alpha$ . Тогда

1) квадрат

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{\gamma} & E \\ \beta \downarrow & & \delta \downarrow \\ B & \xrightarrow{\psi} & C \end{array} \quad (6)$$

универсален;

2) если  $\varphi \in M_c$ , то квадрат (6) коуниверсален.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** 1. Пусть  $u : B \rightarrow X$  и  $v : E \rightarrow X$  — морфизмы такие, что  $u\beta = v\gamma$ . Так как  $\psi = \text{coker } \varphi$  и  $u\varphi = u\beta\alpha = v\gamma\alpha = 0$ , существует единственный морфизм  $w : C \rightarrow X$ , для которого  $u = w\psi$ . Поскольку  $w\delta\gamma = w\psi\beta = u\beta = v\gamma$  и  $\gamma \in P$ , то  $w\delta = v$ . Квадрат (6) универсален.

2. Пусть  $\varphi \in M_c$ . Тогда по лемме 1  $\alpha \in M_c$ ,  $\alpha = \ker \gamma$ ,  $\varphi = \ker \psi$ . Рассмотрим коуниверсальный квадрат

$$\begin{array}{ccc} D_1 & \xrightarrow{\gamma_1} & E \\ \beta_1 \downarrow & & \delta \downarrow \\ B & \xrightarrow{\psi} & C \end{array}$$

Существует такой морфизм  $\varepsilon : D \rightarrow D_1$ , что  $\gamma_1\varepsilon = \gamma$ ,  $\beta_1\varepsilon = \beta$ . Кроме того, существует такой единственный морфизм  $\alpha_1 : A \rightarrow D_1$ , что  $\beta_1\alpha_1 = \varphi$  и  $\gamma_1\alpha_1 = 0$ .

Так как  $\beta_1\varepsilon\alpha = \beta\alpha = \varphi$  и  $\gamma_1\varepsilon\alpha = \gamma\alpha = 0$ , в силу единственности морфизма  $\alpha_1$  имеем  $\alpha_1 = \varepsilon\alpha$ .

В коммутативной диаграмме

$$\begin{array}{ccccc} & & D & & \\ & \nearrow \alpha & \downarrow \varepsilon & \searrow \gamma & \\ A & \xrightarrow{\alpha_1} & D_1 & \xrightarrow{\gamma_1} & E \end{array} \quad (7)$$

имеем

$$\alpha = \ker \gamma, \quad \gamma = \operatorname{coker} \alpha, \quad \alpha_1 = \ker \gamma_1, \quad \gamma_1 = \operatorname{coker} \alpha_1. \quad (8)$$

В произвольной диаграмме (7), удовлетворяющей условиям (8), морфизм  $\varepsilon$  является изоморфизмом. Это утверждение является аксиомой полуабелевой категории Д. А. Райкова. В [5] установлено, что эта аксиома в случае аддитивной категории следует из аксиом 1, 2 и 2\*.

Лемма доказана.

**Лемма 6.** Пусть диаграмма

$$\begin{array}{ccccc} F & \xrightarrow{\varepsilon} & D & \xrightarrow{\gamma} & E \\ \alpha \downarrow & & \beta \downarrow & & \delta \downarrow \\ A & \xrightarrow{\varphi} & B & \xrightarrow{\psi} & C \end{array}$$

в полуабелевой категории коммутативна,  $\gamma = \operatorname{coker} \varepsilon$ ,  $\ker \psi = \operatorname{im} \varphi$ ,  $\varphi \in PO_u$ ,  $\beta \in M$  и квадрат

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\varepsilon} & D \\ \alpha \downarrow & & \beta \downarrow \\ A & \xrightarrow{\varphi} & B \end{array}$$

коуниверсален. Тогда  $\delta \in M$ .

Эта лемма является обобщением леммы 6 из [3]. Там предполагалось, что  $\varphi \in O_c$  и  $\psi = \operatorname{coker} \varphi$ . Оба эти отличия несущественны, и доказательство остается прежним.

Пусть диаграмма

$$\begin{array}{ccccccc} A_0 & \xrightarrow{\varphi_0} & B_0 & \xrightarrow{\psi_0} & C_0 & \longrightarrow & 0 \\ \alpha \downarrow & & \beta \downarrow & & \gamma \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A_1 & \xrightarrow{\varphi_1} & B_1 & \xrightarrow{\psi_1} & C_1 \end{array} \quad (9)$$

в полуабелевой категории коммутативна,  $\psi_0 = \operatorname{coker} \varphi_0$ ,  $\varphi_1 = \ker \psi_1$ .

Так же, как и в случае абелевой категории [6], для диаграммы (9) определен связывающий морфизм  $\delta : \operatorname{Ker} \gamma \rightarrow \operatorname{Coker} \alpha$ , причем Кер-Coker-последовательность

$$\operatorname{Ker} \alpha \xrightarrow{\varepsilon} \operatorname{Ker} \beta \xrightarrow{\zeta} \operatorname{Ker} \gamma \xrightarrow{\delta} \operatorname{Coker} \alpha \xrightarrow{\tau} \operatorname{Coker} \beta \xrightarrow{\theta} \operatorname{Coker} \gamma \quad (10)$$

полуточна.

**Теорема 1.** Если в диаграмме (9) в полуабелевой категории  $\alpha \in MO_u$  ( $\alpha \in PO_u$ ), то последовательность (10) точна в члене  $\operatorname{Ker} \beta$  ( $\operatorname{Ker} \gamma$ ). Если  $\beta \in MO_u$  ( $\beta \in PO_u$ ), то последовательность (10) точна в члене  $\operatorname{Ker} \gamma$  ( $\operatorname{Coker} \alpha$ ).

Если  $\gamma \in MO_u$  ( $\gamma \in PO_u$ ), то последовательность (10) точна в члене  $\text{Coker } \alpha$  ( $\text{Coker } \beta$ ).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $\beta = \beta_1 \bar{\beta} \beta_3$  — каноническое разложение морфизма  $\beta$ , квадраты

$$\begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{\varphi_2} & B_2 & & A_3 & \xrightarrow{\varphi_3} & B_3 \\ \alpha_1 \downarrow & & \beta_1 \downarrow & & \alpha_2 \downarrow & & \bar{\beta} \downarrow \\ A_1 & \xrightarrow{\varphi_1} & B_1, & & A_2 & \xrightarrow{\varphi_2} & B_2 \end{array} \quad (11)$$

коуниверсальны,  $\psi_2 = \text{coker } \varphi_2$ ,  $\psi_3 = \text{coker } \varphi_3$ . Существуют такие морфизмы  $\alpha_3, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ , для которых диаграмма

$$\begin{array}{ccccccc} A_0 & \xrightarrow{\varphi_0} & B_0 & \xrightarrow{\psi_0} & C_0 & \longrightarrow & 0 \\ \alpha_3 \downarrow & & \beta_3 \downarrow & & \gamma_3 \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A_3 & \xrightarrow{\varphi_3} & B_3 & \xrightarrow{\psi_3} & C_3 \longrightarrow 0 \\ \alpha_2 \downarrow & & \bar{\beta} \downarrow & & \gamma_2 \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A_2 & \xrightarrow{\varphi_2} & B_2 & \xrightarrow{\psi_2} & C_2 \longrightarrow 0 \\ \alpha_1 \downarrow & & \beta_1 \downarrow & & \gamma_1 \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A_1 & \xrightarrow{\varphi_1} & B_1 & \xrightarrow{\psi_1} & C_1 \end{array} \quad (12)$$

коммутативна. Так как  $\varphi_1 \in M$  и  $\varphi_1 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = \beta \varphi_0 = \varphi_1 \alpha$ , то  $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 = \alpha$ . Аналогично  $\gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 = \gamma$ . Поскольку квадраты (11) коуниверсальны и  $\varphi_1 \in M_c$ , то  $\varphi_2, \varphi_3 \in M_c$ ,  $\alpha_1 \in M_c$ ,  $\alpha_2 \in M$ . По лемме 6  $\gamma_1, \gamma_2 \in M$ . Так как  $\alpha_1 \alpha_2, \beta_1 \bar{\beta}, \gamma_1 \gamma_2 \in M$ , то  $\ker \alpha = \ker \alpha_3$ ,  $\ker \beta = \ker \beta_3$ ,  $\ker \gamma = \ker \gamma_3$ .

Диаграмме, образованной первыми двумя строками диаграммы (12), соответствует Кер-Сокер-последовательность, связанная с последовательностью (10) диаграммой

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Ker } \alpha_3 & \xrightarrow{\varepsilon'} & \text{Ker } \beta_3 & \xrightarrow{\zeta'} & \text{Ker } \gamma_3 & \xrightarrow{\delta'} & \text{Coker } \alpha_3 \rightarrow 0 \\ \parallel & & \parallel & & \parallel & & a \downarrow \\ \text{Ker } \alpha & \xrightarrow{\varepsilon} & \text{Ker } \beta & \rightarrow & \text{Ker } \gamma & \xrightarrow{\delta} & \text{Coker } \alpha \xrightarrow{\tau} \text{Coker } \beta \xrightarrow{\theta} \text{Coker } \gamma. \end{array} \quad (13)$$

Морфизм  $a$  в этой диаграмме определен условием  $a(\text{coker } \alpha_3) = (\text{coker } \alpha) \alpha_1 \alpha_2$ .

Так как  $\beta_3 \in P_c$ , то по теореме 1 работы [3] верхняя строка диаграммы (13) точна в членах  $\text{Ker } \gamma_3$  и  $\text{Coker } \alpha_3$ , причем  $\delta' \in P_c$ . Определим морфизмы  $\hat{\alpha}_1 : \text{Coker}(\alpha_2 \alpha_3) \rightarrow \text{Coker } \alpha$  и  $\hat{\alpha}_2 : \text{Coker } \alpha_3 \rightarrow \text{Coker}(\alpha_2 \alpha_3)$  условиями  $\hat{\alpha}_1 \text{coker}(\alpha_2 \alpha_3) = (\text{coker } \alpha) \alpha_1$  и  $\hat{\alpha}_2 \text{coker } \alpha_3 = (\text{coker}(\alpha_2 \alpha_3)) \alpha_2$ . Тогда  $a = \hat{\alpha}_1 \hat{\alpha}_2$ . В [3, лемма 10] установлено, что  $\hat{\alpha}_1 = \ker \tau$ .

Если  $\beta \in PO_u$ , то  $\alpha_2 \in P$ . Но тогда и  $\hat{\alpha}_2 \in P$ . Итак,  $\delta = (\ker \tau) \hat{\alpha}_2 \delta'$ ,  $\hat{\alpha}_2 \delta' \in P$ . Следовательно,  $\text{coker } \delta = \text{coim } \tau$ . Последовательность (10) точна в члене  $\text{Coker } \alpha$ .

Пусть  $\alpha \in PO_u$ . Имеем коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} A_0 & \xrightarrow{\alpha_3} & A_3 & \xrightarrow{\text{coker } \alpha_3} & \text{Coker } \alpha_3 \\ \text{id} \downarrow & & \alpha_2 \downarrow & & \hat{\alpha}_2 \downarrow \\ A_0 & \xrightarrow{\alpha_2 \alpha_3} & A_2 & \xrightarrow{\text{coker}(\alpha_2 \alpha_3)} & \text{Coker}(\alpha_2 \alpha_3). \end{array} \quad (14)$$

Так как  $\alpha_1\alpha_2\alpha_3 = \alpha$ ,  $\alpha \in PO_u$ ,  $\alpha_1 \in M_c$ , то по п. 6 леммы 2  $\alpha_2\alpha_3 \in PO_u$ . Ввиду того, что  $\alpha_2 \in M$ , левый квадрат диаграммы (14) коуниверсален. По лемме 6  $\widehat{\alpha}_2 \in M$ . Итак,  $\delta = \widehat{\alpha}_1\widehat{\alpha}_2(\text{coker } \zeta)$ ,  $\widehat{\alpha}_1\widehat{\alpha}_2 \in M$ . Следовательно,  $\ker \delta = \text{im } \zeta$ . Последовательность (10) точна в члене  $\text{Ker } \gamma$ .

Пусть  $\gamma \in PO_u$ . Представим морфизм  $\psi_1$  в виде  $\psi_1 = \psi'_1 \text{coim } \psi_1$ , где  $\psi'_1 = (\text{im } \psi_1)\bar{\psi}_1$  — мономорфизм. Так как  $\psi_0 = \text{coker } \varphi_0$  и  $(\text{coim } \psi_1)\beta\varphi_0 = 0$ , существует морфизм  $\gamma' : C_0 \rightarrow \text{Coim } \psi_1$ , для которого  $\gamma'\psi_0 = (\text{coim } \psi_1)\beta$ . Поскольку  $\psi'_1\gamma'\psi_0 = \psi'_1(\text{coim } \psi_1)\beta = \psi_1\beta = \gamma\psi_0$  и  $\psi_0 \in P$ , то  $\psi'_1\gamma' = \gamma$ .

Диаграмме

$$\begin{array}{ccccccc} A_0 & \xrightarrow{\varphi_0} & B_0 & \xrightarrow{\psi_0} & C_0 & \longrightarrow & 0 \\ \alpha \downarrow & & \beta \downarrow & & \gamma' \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A_1 & \xrightarrow{\varphi_1} & B_1 & \xrightarrow{\text{coim } \varphi_1} & \text{Coim } \varphi_1 \longrightarrow 0 \end{array}$$

соответствует Кер-Сокер-последовательность, которая по теореме 2 работы [3] точна в члене  $\text{Coker } \beta$ . Эта последовательность связана с последовательностью (10) коммутативной диаграммой

$$\begin{array}{ccccccccc} \text{Ker } \gamma' & \xrightarrow{\delta'} & \text{Coker } \alpha & \xrightarrow{\tau} & \text{Coker } \beta & \xrightarrow{\theta'} & \text{Coker } \gamma' & \longrightarrow & 0 \\ \parallel & & \parallel & & \parallel & & \widehat{\psi}'_1 \downarrow & & \\ \text{Ker } \gamma & \xrightarrow{\delta} & \text{Coker } \alpha & \xrightarrow{\tau} & \text{Coker } \beta & \xrightarrow{\theta} & \text{Coker } \gamma, & & \end{array}$$

где морфизм  $\widehat{\psi}'_1$  определен так, что диаграмма

$$\begin{array}{ccccc} C_0 & \xrightarrow{\gamma'} & \text{Coim } \psi_1 & \xrightarrow{\text{coim } \gamma'} & \text{Coker } \gamma' \\ \text{id} \downarrow & & \psi'_1 \downarrow & & \widehat{\psi}'_1 \downarrow \\ C_0 & \xrightarrow{\gamma} & C_1 & \xrightarrow{\text{coim } \gamma} & \text{Coker } \gamma \end{array}$$

коммутативна. По лемме 6  $\widehat{\psi}'_1 \in M$ . Но тогда  $\ker \theta = \ker \theta' = \text{im } \tau$  и последовательность (10) точна в члене  $\text{Coker } \beta$ .

Доказаны три из шести утверждений теоремы 1. Остальные три следуют из доказанных по двойственности.

Теорема доказана.

**Теорема 2.** Если в полуабелевой категории выполнена аксиома 4\*, то для Кер-Сокер-последовательности (10) диаграммы (9)  $\alpha \in MO_u \implies \zeta \in MO_u$ ,  $\beta \in MO_u \implies \delta \in MO_u$ ,  $\gamma \in MO_u \implies \tau \in MO_u$ . Если выполнена аксиома 4, то  $\alpha \in PO_u \implies \zeta \in PO_u$ ,  $\beta \in PO_u \implies \delta \in PO_u$ ,  $\gamma \in PO_u \implies \tau \in PO_u$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В доказательстве теоремы 1 морфизм  $\delta$  был представлен в виде  $\delta = \widehat{\alpha}_1\widehat{\alpha}_2\delta'$ , где  $\widehat{\alpha}_1 \in M_c$ ,  $\delta' \in P_c$ . Если выполнена аксиома 4 и  $\beta \in MO_u$ , то  $\alpha_2 \in MO_u$ . Имеем коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} & A_3 & \xrightarrow{\text{coker } \alpha_3} & \text{Coker } \alpha_3 \\ \alpha_3 \nearrow & \downarrow \alpha_2 & & \downarrow \widehat{\alpha}_2 \\ A_0 & & & \\ \searrow \alpha_2\alpha_3 & A_2 & \xrightarrow{\text{coker}(\alpha_2\alpha_3)} & \text{Coker}(\alpha_2\alpha_3). \end{array}$$

По лемме 5 квадрат

$$\begin{array}{ccc} A_3 & \xrightarrow{\text{coker } \alpha_3} & \text{Coker } \alpha_3 \\ \alpha_2 \downarrow & & \widehat{\alpha}_2 \downarrow \\ A_2 & \xrightarrow{\text{coker}(\alpha_2 \alpha_3)} & \text{Coker}(\alpha_2 \alpha_3) \end{array}$$

универсален. Но тогда  $\widehat{\alpha}_2 \in MO_u$  по утверждению, двойственному п. 5 леммы 2. По утверждению, двойственному п. 4 этой леммы,  $\delta \in MO_u$ .

Предположим теперь, что  $\alpha \in MO_u$  и выполнена аксиома 4\*. Используя каноническое разложение морфизма  $\varphi_0$ , представим этот морфизм в виде  $\varphi_0 = (\text{im } \varphi_0)\varphi'_0$ , где  $\varphi'_0 \in P$ . Так как  $\psi_3\beta_3(\text{im } \varphi_0) = 0$  и  $\varphi_3 = \ker \psi_3$ , существует такой морфизм  $\alpha'_3 : \text{Im } \varphi_0 \rightarrow A_3$ , что  $\varphi_3\alpha'_3 = \beta_3 \text{im } \varphi_0$ . Поскольку  $\varphi_3\alpha'_3\varphi'_0 = \beta_3(\text{im } \varphi_0)\varphi'_0 = \varphi_3\alpha_3$  и  $\varphi_3 \in M$ , то  $\alpha'_3\varphi'_0 = \alpha_3$ . По лемме 4  $\alpha'_3 \in MO_u$ .

Рассмотрим диаграмму

$$\begin{array}{ccccc} & & \text{Ker } \beta \oplus \alpha'_0 & \xrightarrow{p_2} & A'_0 \\ & i_1 \nearrow & j \downarrow & & \varphi_3 \alpha'_3 \downarrow \\ \text{Ker } \beta & \xrightarrow{\ker \beta} & B_0 & \xrightarrow{\beta_3} & B_3, \end{array}$$

в которой  $i_1$  — каноническое вложение первого слагаемого в прямую сумму,  $p_2$  — каноническая проекция на второе слагаемое,  $j = (\ker \beta, \text{im } \varphi_0)$ . По лемме 5 квадрат

$$\begin{array}{ccc} \text{Ker } \beta \oplus A'_0 & \xrightarrow{p_2} & A'_0 \\ j \downarrow & & \varphi_3 \alpha'_3 \downarrow \\ B_0 & \xrightarrow{\beta_3} & B_3 \end{array}$$

коуниверсален. Так как  $\varphi_3 \in M_c$ , по лемме 2  $\varphi_3\alpha'_3 \in MO_u$ . По аксиоме 4\*  $j \in MO_u$ .

Рассмотрим теперь диаграмму

$$\begin{array}{ccccc} & & \text{Ker } \beta \oplus \alpha'_0 & \xrightarrow{p_1} & \text{Ker } \beta \\ & i_2 \nearrow & j \downarrow & & \psi_0(\ker \beta) \downarrow \\ A'_0 & \xrightarrow{\text{im } \varphi_0} & B_0 & \xrightarrow{\psi_0} & C_0, \end{array}$$

в которой  $i_2$  — каноническое вложение второго слагаемого в прямую сумму,  $p_1$  — каноническая проекция на первое слагаемое. По лемме 5 квадрат

$$\begin{array}{ccc} \text{Ker } \beta \oplus A'_0 & \xrightarrow{p_1} & \text{Ker } \beta \\ j \downarrow & & \psi_0(\ker \beta) \downarrow \\ B_0 & \xrightarrow{\psi_0} & C_0 \end{array}$$

универсален. Так как  $j \in MO_u$ , то  $\psi_0(\ker \beta) \in MO_u$ . Поскольку  $\psi_0(\ker \beta) = (\ker \gamma)\zeta$ , по лемме 2  $\zeta \in MO_u$ . Установлено, что при выполнении аксиомы 4\*  $\alpha \in MO_u \implies \zeta \in MO_u$ . Доказательство следования  $\alpha \in PO_u \implies \zeta \in PO_u$  при выполнении аксиомы 4 аналогично. Доказаны три из шести утверждений теоремы 2. Остальные двойственны доказанным.

Теорема доказана.



Пусть  $A = (A^n, d_A^n)_{n \in \mathbb{Z}}$  — коцепной комплекс в аддитивной категории, удовлетворяющей аксиоме 1. Для каждого  $n \in \mathbb{Z}$  существует единственный морфизм  $a_A^n : \text{Coker } d_A^{n-1} \rightarrow \text{Ker } d_A^{n+1}$ , удовлетворяющий условию

$$(\text{ker } d_A^{n+1}) a_A^n (\text{coker } d_A^{n-1}) = d_A^n. \quad (15)$$

Определены кохомологии  $H^n(A) = \text{Coker } a_A^{n-1}$  и  $\tilde{H}^n(A) = \text{Ker } a_A^n$  комплекса  $A$ . Существует канонический морфизм  $m_A^n : H^n(A) \rightarrow \tilde{H}^n(A)$ , определенный условием

$$(\text{ker } a_A^n) m_A^n (\text{coker } a_A^{n-1}) = (\text{coker } d_A^{n-1}) (\text{ker } d_A^n).$$

Если категория полуабелева, то  $m_A^n$  — изоморфизм [2].

Произвольный морфизм  $\varphi : A \rightarrow B$  комплексов индуцирует морфизмы  $\hat{\varphi}^n : \text{Ker } d_A^n \rightarrow \text{Ker } d_B^n$  и  $\tilde{\varphi}^n : \text{Coker } d_A^{n-1} \rightarrow \text{Coker } d_B^{n-1}$ . Строго точной последовательности комплексов

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \rightarrow 0 \quad (16)$$

в полуабелевой категории соответствуют коммутативная диаграмма

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Coker } d_A^{n-1} & \xrightarrow{\tilde{\varphi}^n} & \text{Coker } d_B^{n-1} & \xrightarrow{\tilde{\psi}^{n-1}} & \text{Coker } d_C^{n-1} & \longrightarrow & 0 \\ a_A^n \downarrow & & a_B^n \downarrow & & a_C^n \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \text{Ker } d_A^{n+1} & \xrightarrow{\hat{\varphi}^{n+1}} & \text{Ker } d_B^{n+1} & \xrightarrow{\hat{\psi}^{n+1}} & \text{Ker } d_C^{n+1} \end{array}$$

и ее Кер-Сокер-последовательность

$$\tilde{H}^n(A) \xrightarrow{\varepsilon^n} \tilde{H}^n(B) \xrightarrow{\zeta^n} \tilde{H}^n(C) \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(A) \xrightarrow{\tau^{n+1}} H^{n+1}(B) \xrightarrow{\theta^{n+1}} H^{n+1}(C). \quad (17_n)$$

Наличие изоморфизмов  $m_C^n$  позволяет объединить последовательности (17<sub>n</sub>) в одну последовательность

$$\dots \rightarrow H^n(A) \xrightarrow{\tau^n} H^n(B) \xrightarrow{\zeta^n} H^n(C) \xrightarrow{\Delta^n} H^{n+1}(A) \rightarrow \dots, \quad (18)$$

где  $\Delta^n = \delta^n m_C^n$ .

**Теорема 3.** Для кохомологической последовательности (18), соответствующей строго точной последовательности (16), выполнены следующие утверждения.

1. Если  $d_A^n \in MO_u$  ( $d_A^n \in PO_u$ ), то последовательность (18) точна в члене  $H^n(B)$  (в члене  $H^n(C)$ ). Если при этом выполнена аксиома 4\* (аксиома 4), то  $\theta^n \in MO_u$  ( $\theta^n \in PO_u$ ).

2. Если  $d_B^n \in MO_u$  ( $d_B^n \in PO_u$ ), то последовательность (18) точна в члене  $H^n(C)$  (в члене  $H^{n+1}(A)$ ). Если при этом выполнена аксиома 4\* (аксиома 4), то  $\Delta^n \in MO_u$  ( $\Delta^n \in PO_u$ ).

3. Если  $d_C^n \in MO_u$  ( $d_C^n \in PO_u$ ), то последовательность (18) точна в члене  $H^{n+1}(A)$  (в члене  $H^{n+1}(B)$ ). Если при этом выполнена аксиома 4\* (аксиома 4), то  $\tau^{n+1} \in MO_u$  ( $\tau^{n+1} \in PO_u$ ).

**Доказательство.** Пусть  $d_B^n \in MO_u$ . Из (15) следует, что  $a_B^n \in MO_u$ . По теореме 1 последовательность (17<sub>n</sub>) точна в члене  $\tilde{H}^n(C)$ . Диаграмма

$$\begin{array}{ccccccc} H^n(A) & \xrightarrow{\tau^n} & H^n(B) & \xrightarrow{\theta^n} & H^n(C) & & \\ m_A^n \downarrow & & m_B^n \downarrow & & m_C^n \downarrow & \searrow \Delta^n & \\ \tilde{H}^n(A) & \xrightarrow{\varepsilon^n} & \tilde{H}^n(B) & \xrightarrow{\zeta^n} & \tilde{H}^n(C) & \xrightarrow{\delta^n} & H^{n+1}(A) \end{array}$$

коммутативна. Так как  $m_C^n$  и  $m_B^n$  — изоморфизмы, последовательность (18) точна в члене  $H^n(C)$ . Если выполнена аксиома  $4^*$ , то по теореме 2  $\delta^n \in MO_u$ . Но тогда и  $\Delta^n \in MO_u$ . Одно из утверждений теоремы 3 доказано. Остальные доказываются аналогично.

**Следствие.** В специальной полуабелевой категории кохомологическая последовательность (18), соответствующая строго точной последовательности (16), точна.

В заключение отметим, что вопрос о том, выполнены ли аксиомы 4 и  $4^*$  в произвольной полуабелевой категории, остается открытым.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Райков Д. А. Полуабелевы категории // Докл. АН СССР. 1969. Т. 188, № 5. С. 1006–1009.
2. Копылов Я. А., Кузьминов В. И. О точности кохомологической последовательности для короткой точной последовательности комплексов в полуабелевой категории // Тр. конференции «Геометрия и приложения». Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2001. С. 76–83.
3. Копылов Я. А., Кузьминов В. И. О Кер-Сокер-последовательности в полуабелевой категории // Сиб. мат. журн. 2000. Т. 41, № 3. С. 615–624.
4. Букур И., Деяну А. Введение в теорию категорий и функторов. М.: Мир, 1972.
5. Кузьминов В. И., Черевикин А. Ю. О полуабелевых категориях // Сиб. мат. журн. 1972. Т. 13, № 6. С. 1284–1294.
6. Гельфанд С. И., Манин Ю. И. Методы гомологической алгебры. Т. I. Введение в теорию кохомологий и производные функторы. М.: Наука, 1988.

*Статья поступила 2 августа 2001 г.*

*Глотко Николай Владимирович*

*Новосибирский гос. университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск 630090*

*Кузьминов Владимир Иванович*

*Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск 630090*

*kuzminov@math.nsc.ru*