

§ 1.3. Предел последовательности

3.1. Точные границы. Начнем с анализа точных границ последовательностей. Сначала напомним определение точной границы множества.

ТЕОРИЯ

Множество $A \subset \mathbb{R}$ называют *ограниченным сверху (снизу)*, если существует такое число C , что для любого $x \in A$ выполнено неравенство $x \leq C$ (соответственно $x \geq C$).

Число $b \in \mathbb{R}$ называют *верхней (нижней) границей* множества $A \subset \mathbb{R}$, если $(\forall x \in A) x \leq b$ (соответственно $(\forall x \in A) x \geq b$ (рис. 1.3). С использованием кванторов ограниченность сверху (снизу) выражается так:

$$(\exists C \forall x \in A) \quad x \leq C \quad (1)$$

(соответственно

$$(\exists C \forall x \in A) \quad x \geq C. \quad (2)$$

Можно сказать, что множество ограничено сверху (снизу), если множество его верхних (нижних) границ непусто.

Множество в $\mathbb{R}$ называют *ограниченным*, если оно ограничено сверху и снизу. Ограниченность множества $A \subset \mathbb{R}$ можно описать так:

$$(\exists C > 0 \forall x \in A) \quad |x| \leq C. \quad (3)$$

Если множество не обладает свойством ограниченности сверху или снизу, его называют *неограниченным* соответственно сверху или снизу. Обращаясь к отрицанию высказываний (1)–(3), можно описать неограниченность сверху, снизу и двустороннюю:

$$(\forall C \exists x \in A) \quad x > C,$$

$$(\forall C \exists x \in A) \quad x < C,$$

$$(\forall C \exists x \in A) \quad |x| > C.$$

Наименьшую из верхних границ множества A называют его *точной верхней границей* и обозначают через $\sup A$ (читается «супремум A »).




Рис. 3.1.

Двойственным образом определяют точную нижнюю границу $\inf A$ множества $A \subset \overline{\mathbb{R}}$ как наибольшую из его нижних границ (читается «инфимум A »).

Утверждение. Каждое подмножество в $\overline{\mathbb{R}}$ имеет точную верхнюю и точную нижнюю границы. Если при этом $A \subset \mathbb{R}$ непусто и ограничено сверху (снизу) (в $\mathbb{R}$), то $\sup A \in \mathbb{R}$ ($\inf A \in \mathbb{R}$), так что такое множество A имеет точную верхнюю (нижнюю) границу в $\mathbb{R}$. Для неограниченного сверху (снизу) множества A будет $\sup A = +\infty$ (соответственно $\inf A = -\infty$).

ТЕХНОЛОГИИ

Согласно определению точных границ для доказательства, например, равенства $\sup A = a$, в котором сообщается, что стоящее в правой его части число a является точной верхней границей множества A , надо проверить два свойства:

1) a — верхняя граница A , т. е.

$$(\forall x \in A) \quad x \leq a;$$

2) граница a наименьшая, иначе говоря, если b — какая-либо граница A , то a ее не больше, т. е.

$$\text{если } (\forall x \in A) \quad x \leq b, \text{ то } a \leq b.$$

Аналогичное можно сказать и о равенстве $\inf A = a$.

Обычно при обосновании того факта, что какое-то число служит точной границей последовательности используют критерий точной границы (рис. 3.2).

Теорема (критерий точной верхней границы). Если A — непустое ограниченное сверху множество в $\mathbb{R}$, то равенство $\sup A = a$ равносильно тому, что

1) a — верхняя граница A ;

2) любое число $b < a$ уже не является верхней границей множества A , т. е.

$$(\forall b < a \exists x \in A) \quad x > b.$$

Свойство 2 можно сформулировать в терминах отклонения числа b от границы a , и это выглядит так:

2') для любого $\varepsilon > 0$ смещение от a вниз на ε не является верхней границей A , т. е.

$$(\forall \varepsilon > 0 \exists x \in A) \quad x > a - \varepsilon.$$




Рис. 3.2.

Точной верхней (нижней) границей последовательности называют точную верхнюю (нижнюю) границу множества ее членов.

Пример 1. Докажем, что для любого непустого ограниченного множества $A \subset \mathbb{R}$ и для любого числа $\lambda \geq 0$ справедливо равенство

$$\sup \lambda A = \lambda \sup A$$

(здесь $\lambda A = \{\lambda x : x \in A\}$).

Если $\lambda = 0$, утверждение очевидно. Будем считать, что $\lambda \neq 0$.

Обозначим $a = \sup A$. Требуется доказать, что λa — точная верхняя граница множества λA . Как указано выше, для этого надо проверить, что λa — верхняя граница и что сдвиг вниз на произвольное $\varepsilon > 0$ уже не будет верхней границей. На чем основывать проверку? Разумеется, на данных в условии свойствах. Так как $a = \sup A$, число a — верхняя граница множества A , стало быть, $(\forall x \in A) \quad x \leq a$. Умножив неравенство на положительное число, получаем, что $(\forall x \in A) \quad \lambda x \leq \lambda a$, так что λa — верхняя граница.

Проверим второе свойство. Пусть дано произвольное $\varepsilon > 0$. Надо подобрать такое $x \in A$, что $\lambda x > \lambda a - \varepsilon$. Запишем последнее неравенство, изолировав в нем x : $x > a - \frac{\varepsilon}{\lambda}$, и вновь воспользуемся условием, согласно которому для любого $\varepsilon_1 > 0$ найдется такое $x \in A$, что $x > a - \varepsilon_1$. Взяв

в качестве ε_1 число $\frac{\varepsilon}{\lambda}$, получаем, что для любого $\varepsilon > 0$ есть такое $x \in A$, что $x > a - \frac{\varepsilon}{\lambda}$, это и требовалось.

Пример 2. Найти точные границы последовательности

$$x_n = \frac{n}{n+1} \sin^2 \frac{n\pi}{4}.$$

Легко заметить, что наша последовательность ограничена сверху единицей, а снизу — нулем. Используя свойства периодичности синуса, можно утверждать, что множитель $\sin^2 \frac{n\pi}{4}$ принимает значение 0 на номерах вида $n = 4k$, $k \in \mathbb{N}$, значение $1/2$ на номерах вида $n = 2k + 1$, $k \in \mathbb{N}$, и значение 1 на номерах вида $n = 4k + 2$, $k \in \mathbb{N}$. Последовательность $\frac{n}{n+1}$ положительна и возрастает. Из этих наблюдений можно сделать вывод, что найдется такой номер $n \in \mathbb{N}$, для которого $x_n = 0$ (и таких номеров будет много). Нижняя граница, достигаемая на каком-то элементе, очевидно, будет точной, так что $\inf x_n = 0$. Займемся точной верхней границей. Умножая близкое к единице значение $\frac{n}{n+1}$ на единицу (при соответствующих номерах), мы будем получать близкие к единице числа. Это позволяет предположить, что точной верхней границей будет единица. Обоснуем эту гипотезу. Действительно, пусть задано произвольное $\varepsilon > 0$. Возьмем номер n вида $4k + 2$ и попытаемся подобрать такое $k \in \mathbb{N}$, что $1 - \varepsilon < x_{4k+2}$, т. е. $1 - \varepsilon < \frac{4k+2}{4k+3}$. Решая это неравенство, в котором ε считается параметром, а k — искомой величиной, получим, что при $\varepsilon \geq 1$ требуемое неравенство выполнится при любом k , а при $\varepsilon < 1$ — для $k > \frac{1-3\varepsilon}{4\varepsilon}$. Итак, правило выбора по заданному $\varepsilon > 0$ требуемого номера n найдено, так что $\sup x_n = 1$.

ПРАКТИКА

1. Доказать, что для любого непустого ограниченного множества $A \subset \mathbb{R}$ и для любого числа $\lambda \geq 0$ справедливо равенство

$$\inf \lambda A = \lambda \inf A.$$

2. Доказать, что для любого непустого ограниченного множества $A \subset \mathbb{R}$ выполнены равенства

$$\sup(-A) = -\inf A, \quad \inf(-A) = -\sup A.$$

3. Доказать, что для любых непустых ограниченных множеств $A, B \subset \mathbb{R}$ справедливо равенство

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B.$$

(здесь $A + B = \{x + y : x \in A, y \in B\}$).

4. Положим $x^+ = \max\{x, 0\}$, $x^- = \max\{-x, 0\}$. Показать, что

$$\max\{x, y\} = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|) = y + (x - y)^+ = x + (y - x)^+,$$

$$\min\{x, y\} = \frac{1}{2}(x + y - |x - y|) = y - (x - y)^- = x - (y - x)^-,$$

где $\max\{x, y\}$ и $\min\{x, y\}$ соответственно наибольшее и наименьшее из чисел x, y .

5. Найти точные границы последовательностей

$$(1) \ x_n = 1 + \frac{n}{n+1} \cos \frac{n\pi}{2}, \quad (2) \ x_n = (-1)^{n-1} \left(2 + \frac{3}{n}\right),$$

$$(3) \ x_n = \frac{n-1}{n+1} \cos \frac{2n\pi}{3}, \quad (4) \ x_n = 1 + n \sin \frac{n\pi}{2}.$$

6*. Доказать, что для любого $x \in \mathbb{R}$, $x \geq 0$, существует единственное число $a \in \mathbb{R}$, $a \geq 0$, такое, что $a^2 = x$.

3.2. Предел последовательности.

ТЕОРИЯ

Пусть даны последовательность x_n и число a . Договоримся о том, как математически выразить интуитивно ясное представление о том, что последовательность x_n неограниченно приближается к числу a , т. е. значения x_n при неограниченном увеличении n становятся всё ближе и ближе к a .

Сначала обратимся к геометрической поддержке. Так как *последовательность* — это функция, определенная на множестве $\mathbb{N}$ натуральных чисел, для ее геометрического представления можно использовать график как множество всех упорядоченных пар (n, x_n) на координатной плоскости. Правда, в этом случае сплошной линии, как у графиков обычных функций, не получится, а будет «пунктирное» множество, но это обстоятельство не должно нас смущать.




Рис. 3.3.

Изобразим координатную плоскость, на которой по оси абсцисс отметим натуральные $n = 1, 2, \dots$ и над каждой отмеченной точкой на высоте x_n поместим в виде точки значение x_n последовательности. На оси ординат отметим точку a (рис. 1).

Поскольку нас интересует неограниченное приближение x_n к a «в перспективе», при далеких номерах n , расположение последовательности при начальных номерах нас не интересует. Представим себе, что есть два участника договоренности: **Вы** и **Я**. Вы намерены убедить меня в том, что последовательность x_n неограниченно приближается к a , и если удастся это сделать, то мы вместе назовем это обстоятельство выражениями « a есть *предел* последовательности x_n » или «последовательность x_n *сходится* (или *стремится*) к a » (последние выражения не следует понимать буквально, это термины, которые означают лишь то, что за ними кроется).

Так как Вы убеждаете меня в неограниченном приближении, Я, естественно, должен проверять, насколько значения x_n отличаются от величины a , для чего приготовлю число, которым буду измерять точность приближения, или, иначе говоря, степень отклонения x_n от a . Естественно, число должно быть положительным. Я буду обозначать его греческой буквой ε . Согласно договору приближение должно быть неограниченным, т. е. надо гарантировать невозможность вставить границу между значениями x_n с далекими номерами и числом a . Это можно гарантировать, например, такой процедурой. Я буду предлагать Вам какое-то, неизвестное Вам заранее значение $\varepsilon > 0$, а от Вас буду ожидать, что Вы

обеспечите отклонение x_n от a в пределах заданной точности ε для всех далеких номеров n , т. е. сумеете найти такой номер n_0 , что для всех номеров $n \geq n_0$ отклонение x_n от a будет в пределах от $-\varepsilon$ до ε . Последнее можно выразить так: $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$, или так: $|x_n - a| < \varepsilon$. Обратившись к рис. 1, об этом можно сказать так: Вы обеспечите такой номер n_0 , что для всех n , лежащих правее от этого номера, отмеченные на высоте x_n точки, изображающие элементы последовательности, окажутся в полосе между горизонтальными линиями, проведенными на высотах $a - \varepsilon$ и $a + \varepsilon$. Если Вы не можете обеспечить отклонение x_n от a в пределах заданной мной точности $\varepsilon > 0$ для всех далеких номеров n , то Я не готов согласиться с тем, что x_n неограниченно приближается к a .

Сформулируем договоренность в математических терминах.

Определение. Число $a \in \mathbb{R}$ будем называть *пределом последовательности* x_n , если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $n_0 \in \mathbb{N}$, что для любого $n \geq n_0$ выполняется неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$, при этом будем использовать обозначение $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Часть обозначения вида $n \rightarrow \infty$ подчеркивает, что мы оцениваем близость x_n к a при неограниченном возрастании номеров n . Часто в этом случае говорят «при n , стремящемся к бесконечности». Заметим однако, что каждое число находится на своем месте и никуда не стремится, тем самым эту фразу не следует воспринимать буквально. Это всего лишь фрагмент термина, за которым скрывается определенное содержание. Поскольку ни при каких других обстоятельствах мы оценивать отклонение x_n от a не будем, в обозначениях часть $n \rightarrow \infty$ иногда (даже, скорее всего, всегда, если достаточно ясно, по какой переменной происходит переход к пределу) будем опускать и писать просто $a = \lim x_n$.

Тот факт, что $a = \lim x_n$, выражают также словами «последовательность x_n *сходится* (или *стремится*) к a » и записывают $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$ или, короче, $x_n \rightarrow a$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Говорят, что последовательность имеет пределом соответственно $+\infty$, $-\infty$ и ∞ (плюс бесконечность, минус бесконечность или бесконечность без знака), если для любого $E > 0$ существует $n_0 \in \mathbb{N}$ такое, что для любого $n \geq n_0$ выполнено неравенство $x_n > E$, $x_n < -E$ и $|x_n| > E$.

Последовательность, имеющую какой-либо из бесконечных пределов, называют *бесконечно большой*.

Если последовательность имеет (конечный) предел, то ее называют *сходящейся*. Тем самым термин «сходится» применяют только в случае конечного предела, в общем случае используют термин «стремится».

ТЕХНОЛОГИИ

Обсудим, как доказывать тот факт, что $a = \lim x_n$, и выработаем признак конца доказательства. Поскольку конструкция предела последовательности похожа на конструкцию неограниченности функции, ясно, что и обсуждение будет аналогичным рассмотрению свойства неограниченности.

Поскольку здесь есть внешнее, от нас не зависящее требование $\forall \varepsilon > 0$, мы должны выработать **правило поиска** требуемого далее значения $n_0 \in \mathbb{N}$ в зависимости от какого-то нам неизвестного значения ε . Рассуждение, посвященное подбору n_0 , надо начинать, например, так: пусть дано произвольное $\varepsilon > 0$. Этим мы подчеркиваем, что готовы к выработке правила. После этого надо пойти в конец и посмотреть, что от нас ожидают. А от нас ожидают, что мы для произвольного $n \geq n_0$ гарантируем оценку $|x_n - a| < \varepsilon$, где n_0 нам предстоит указать.

Для выбора номера n_0 , начиная с которого будет выполнена требуемая оценка, попробуем *ограничить сверху разность* $|x_n - a|$ *чем-то более простым, но все еще малым*. Иначе говоря, попробуем подобрать такую последовательность a_n , что $|x_n - a| \leq a_n$ и есть шанс подобрать по заданному $\varepsilon > 0$ номер n_0 для последовательности a_n так, что $a_n < \varepsilon$ для всех $n \geq n_0$. Если ясно, как это сделать, то найденный номер n_0 подойдет и для разности $|x_n - a|$ — она ведь не больше чем a_n и тем более будет меньше чем ε . Если еще недостаточно видно, как подобрать номер для последовательности a_n , то, в свою очередь, можно попробовать ограничить ее другой последовательностью, более простой, но все еще малой. И так продолжать процесс до тех пор, пока не появится последовательность, для которой требуемый номер найти уже легко. Как только нам удастся выработать правило выбора требуемого номера n_0 по заданному $\varepsilon > 0$, доказательство закончится.

Можно рассуждать несколько иначе. Пусть дано $\varepsilon > 0$. Обратимся к тому, что от нас потребуется. Мы должны обеспечить выполнение неравенства $|x_n - a| < \varepsilon$ для всех достаточно далеких номеров n . Поставим вопрос: откуда можно получить выполнение такого неравенства? Иначе говоря, из какого соотношения это неравенство вытекает? Если взять последовательность a_n такую, что $|x_n - a| \leq a_n$, и найти номер n_0 такой,

что $a_n < \varepsilon$ для всех $n \geq n_0$, то для этих же номеров n будет выполнено и требуемое неравенство. Если для последовательности a_n выбор номера затруднен, то процесс можно продолжить и вновь обратиться к вопросу: откуда можно получить выполнение такого неравенства? Ответ на него может привести к другой последовательности, и так следует продолжать процесс до тех пор, пока не найдется такая последовательность, для которой выбор номера тривиален.

Эти рассуждения относятся, скорее, к доказательству равенства $a = \lim x_n$ для конкретной последовательности x_n . Отчасти их можно применять и тогда, когда речь идет о доказательстве утверждений с участием предела. Однако если для конкретной последовательности выбор номера обеспечивается ограничением сверху какими-то также конкретными последовательностями, то в утверждениях выбор требуемого номера, как правило, обеспечивается ограничениями сверху, исходящими из предельных свойств, данных в условии.

Пример 1. Докажем, что

$$\lim \frac{n \sin n^2}{n^4 + 1} = 0. \quad (2.7)$$

Пусть дано $\varepsilon > 0$. Пойдем в конец определения предела последовательности и посмотрим, что от нас будут ожидать. От нас потребуется обеспечить выполнение неравенства

$$\left| \frac{n \sin n^2}{n^4 + 1} \right| < \varepsilon$$

для всех далеких номеров. Попробуем ограничить левую часть последнего неравенства сверху чем-то более простым, но все еще малым. Заметив, что $|\sin n^2| \leq 1$, имеем

$$\left| \frac{n \sin n^2}{n^4 + 1} \right| \leq \frac{n}{n^4 + 1}.$$

Легко ли подобрать требуемый номер, исходя из новой последовательности, т. е. насколько легко выразить n через ε из неравенства

$$\frac{n}{n^4 + 1} < \varepsilon?$$

По-видимому, не столь легко, сколь хотелось бы. Поэтому попробуем ограничить выражение $\frac{n}{n^4 + 1}$ сверху сверху чем-то более простым, но

все еще малым. Уменьшив знаменатель, мы увеличим дробь, поэтому

$$\frac{n}{n^4 + 1} \leq \frac{n}{n^4} = \frac{1}{n^3}.$$

Легко ли выразить n через ε из неравенства $\frac{1}{n^3} < \varepsilon$? Легко. Можно выразить, а можно еще облегчить выражение, если заметить, что $\frac{1}{n^3} \leq \frac{1}{n}$, а из неравенства $\frac{1}{n} < \varepsilon$ выразить n через ε совсем легко. Последнее неравенство равносильно тому, что $n > \frac{1}{\varepsilon}$, и в качестве требуемого номера n_0 можно взять любое натуральное число, большее чем $\frac{1}{\varepsilon}$. Например, можно взять $n_0 = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, где взятие целой части (символизируют квадратные скобки) «обнатурализует» дробь $\frac{1}{\varepsilon}$, при этом, возможно, немного уменьшая ее, а добавление единицы делает результат бóльшим, чем $\frac{1}{\varepsilon}$. Если $n_0 \in \mathbb{N}$ и $n_0 > \frac{1}{\varepsilon}$, то для любого $n \geq n_0$ тем более $n > \frac{1}{\varepsilon}$, а тогда, пользуясь логикой предыдущих рассуждений, можно гарантировать, что для таких номеров также

$$\left| \frac{n \sin n^2}{n^4 + 1} \right| < \varepsilon.$$

Правило выбора требуемого номера n_0 по заданному ε сформировано, значит, соотношение (2.7) доказано.

Пример 2. Доказать, что $\lim \frac{n}{2^n} = 0$.

Пусть дано $\varepsilon > 0$. Ориентируясь на него, озаботимся поиском оценки сверху для членов нашей последовательности. Пронаблюдав за несколькими первыми ее членами, предположим, что $\frac{n}{2^n} \leq \frac{1}{n}$, т. е. $n^2 \leq 2^n$ для $n \geq 4$. Действительно, такое неравенство верно, что легко доказывается, например, методом математической индукции. Значит, $\frac{n}{2^n} \leq \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$, и мы пришли к достаточно простой последовательности для обеспечения выбора номера. Подберем n_0 так, чтобы $\frac{1}{n_0} < \varepsilon$, т. е. возьмем какое-либо

натуральное n_0 , удовлетворяющее неравенству $n_0 \geq \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$. Тогда для $n \geq n_0$ будет $\frac{1}{n} < \varepsilon$, а значит, и $\frac{n}{2^n} \leq \varepsilon$.

ПРАКТИКА

1. Доказать равенства

$$\begin{aligned} (1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} &= 1, & (2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} &= 0, \\ (3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \sin n!}{(n+1)^3} &= 0, & (4) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} &= 1. \end{aligned}$$

2. Доказать равенства

$$\begin{aligned} (1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} &= 0, & (2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} &= 0, \\ (3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} &= 0, \quad a > 1, & (4) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} &= 0, \quad a > 1, \quad k \in \mathbb{R}, \\ (5) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} &= 1, \quad a > 0, & (6) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} nq^n &= 0, \quad |q| < 1, \\ (7) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} &= 1, & (8) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} &= 0, & (9) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} &= 0. \end{aligned}$$

3. Доказать, что последовательность $x_n = n^2 \cos \frac{n\pi}{2}$ неограниченная, но не является бесконечно большой.

4. Доказать, что

$$\begin{aligned} (1) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (\log_a n)^p &= +\infty, \quad a > 1, \quad p \geq 1; \\ (2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2-1} - \sqrt{n}) &= +\infty. \\ (3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (4\sqrt{n} - n) &= -\infty; & (4) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{1 - \sqrt[n]{n}} &= -\infty. \end{aligned}$$

5. Пусть последовательность x_n сходится, а y_n расходится. Что можно утверждать о сходимости последовательностей $x_n + y_n$, $x_n y_n$?

3.3. Критерий Коши.

ТЕОРИЯ

Как можно заметить, в определении предела участвует само значение предела. Однако бывает важно просто знать, сходится последовательность или нет. Сформулированный ниже критерий дает принципиальную возможность судить о сходимости числовой последовательности, не прибегая к значению ее предела.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Последовательность x_n называют *фундаментальной*, или *сходящейся в себе*, или *последовательностью Коши*, если

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0(\varepsilon))(\forall m > n_0 \forall n > n_0) \quad |x_m - x_n| < \varepsilon.$$

Условие фундаментальности иногда удобно использовать в следующем виде:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0(\varepsilon))(\forall n > n_0 \forall p \geq 0) \quad |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon.$$

Теорема (критерий Коши). Для существования конечного предела числовой последовательности необходимо и достаточно, чтобы она была фундаментальной.

ТЕХНОЛОГИИ

Критерий Коши редко используется для доказательства сходимости конкретных последовательностей, он чаще участвует в теоретических вопросах. Тем не менее надо представлять себе основные особенности его применения.

Для доказательства сходимости последовательности с помощью критерия Коши надо поступать так же, как поступали при доказательстве того, что некоторое число является пределом данной последовательности. Отличие здесь в том, что при обосновании фундаментальности надо по заданному ε конструировать правило выбора номера, обслуживающего не один индекс, как в пределе последовательности, а два, стало быть, разность $|x_{n+p} - x_n|$ надо оценивать сверху чем-то более простым, малым, и не зависящим от p , чтобы влияния этого параметра на выбор номера не было. Конкретная реализация указанного пожелания своя в каждом конкретном случае.

ПРАКТИКА

1. Используя критерий Коши, доказать сходимость следующих последовательностей:

$$x_n = a_0 + a_1 q + \dots + a_n q^n, \quad |a_k| \leq M, \quad k = 0, 1, \dots, \quad |q| < 1; \quad (1)$$

$$x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n}{2^n}; \quad (2)$$

$$x_n = \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + \dots + \frac{\cos n!}{n(n+1)}; \quad (3)$$

$$x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}. \quad (4)$$

2. Пользуясь критерием Коши, доказать расходимость последовательности

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}.$$

3. Говорят, что *последовательность x_n имеет ограниченное изменение*, если существует такое число C , что

$$|x_2 - x_1| + |x_3 - x_2| + \dots + |x_n - x_{n-1}| \leq C$$

для любого $n \in \mathbb{N}$. Доказать, что последовательность с ограниченным изменением сходится. Обратное неверно (построить пример).